

## 大腸鏡檢查與胃鏡檢查 出院指導

1. 檢查後，可以恢復使用之前的處方藥，但是24小時內禁止服用阿司匹靈或者消炎藥。直到\_\_\_\_\_時，才能重新開始服用可邁丁Coumadin (華法林 Warfarin)。
2. 自檢查之日起，與為您檢查的醫師預約\_\_\_\_\_周後見面。
3. 如果進行了大腸鏡檢查，檢查後會感到腫脹，這是由於在檢查的過程中引入空氣所致。
4. 如果進行了胃鏡檢查，您會持續數小時感到喉嚨輕微疼痛。同時，還會在檢查後立即感到持續數分鐘的腫脹，這是由於在檢查胃部的過程中引入空氣所致。
5. 仔細觀察是否出現以下症狀：
  - 發熱或者寒戰。
  - 嚴重的腹痛，以及在檢查後頭6~12小時常會出現持續30~60分鐘以上的輕度痙攣。
  - 噁心或者嘔吐。
  - 出血或者黑便。
  - 任何異常疼痛或者問題。
  - 靜脈針插入之處出現疼痛或者壓痛。

如果出現上述症狀，請與您的醫生聯絡，或者到您最近的急診室就診（最好能到紅河谷百年醫院 Rouge Valley Centenary Hospital 的急診室就診，我們有外科醫生在那裏每週七天，每天24小時服務）。



6. 休息。在檢查的過程中，我們會為您注射鎮靜藥物，這可能會令您感到疲乏。
7. 檢查後24小時內禁止飲酒。這是由於酒精會加重鎮靜藥物的藥效。注射鎮靜藥物的同時飲酒，會對您的身體造成無法預知的影響，這種影響對您的健康存在潛在的危險。
8. 檢查後第二天，您才能夠駕駛或者操作機械。這是由於駕駛或者操作機械都需要集中精神，並且反應靈敏；但由於您注射了鎮靜藥，藥物可能會對此造成不良的影響。如果您當天有無法取消的約會，那麼，我們建議請其他人代您駕駛。
9. 檢查後第二天，您才能夠簽署合約或者法律文書。這是由於鎮靜藥可能會使您行動和思維都變得遲緩。您的客觀評價能力可能會被削弱。

患者或者其家屬必須表示完全理解以上資訊。

\_\_\_\_\_  
患者或其家屬簽字 Patient / Relative Signature

\_\_\_\_\_  
工作人員簽字 Staff Signature

\_\_\_\_\_  
日期 Date



檢查結果

將此表格複製，黏貼於患者病歷中。